

DISPUTATIO MEDICA  
INAUGURALIS  
DE  
D Y S P H A G I A ;

*QUAM,*

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,

D. GEORGII BAIRD, SS.T.P.  
*ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;*

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu ; et

Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto ;

PRO

*GRADU DOCTORATUS,*

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS ;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

ALEXANDER MONRO,  
*BRITANNUS.*

Ad diem 12. Septembris, horâ locoque solitis.



EDINBURGI:  
EXCUDEBANT ADAMUS NEILL ET SOCII.

=====

M DCC XCVII.



VIRIS EXIMIIS,

ALEXANDRO MONRO,  
FRANCISCO HOME,  
JOSEPHO BLACK,  
JACOBO GREGORY,  
DANIELI RUTHERFORD,  
ANDREÆ DUNCAN,  
THOMÆ CAROLO HOPE,  
ALEXANDRO HAMILTON,

ARTIS MEDICÆ

IN ACADEMIA EDINENSI

PROFESSORIBUS DIGNISSIMIS,

PRÆCEPTORIBUS SUIS SPECTATISSIMIS,

CUM OB CONSILIA ET PRÆCEPTA,

TUM OB AMICITIAM,

QUA ILLUM DIGNATI SUNT,

SEMPER COLENDIS,

HOC OPUSCULUM,

GRATI ANIMI TESTIMONIUM,

SACRUM VOLUIT

AUCTOR.



# DISPUTATIO MEDICA

## INAUGURALIS

DE

# D Y S P H A G I A.

---

**P**ER Dyſphagiam, plerique Medici intelligunt, id corporis vitium, quo potestas devorandi vel ex toto aboletur vel magnoperè impeditur.

Morbi hujus mentionem ſæpiſſimè faciunt auctores ; eique nomen alii aliud impo-  
nunt.

A

Apud

Apud VOGELIUM *Oesophagismus*, LINNÆUM *Agglutitio*, SAUVAGESIUM CULLENUMQUE *Dysphagia*, appellatur; et quia hoc nomen maximè in usu est, eo nos quoque utemur.

Cùm hoc vitium a variis omninò fontibus, et ab aliis morbis prægressis, originem ducat, et igitur sæpè nec sine gravi periculo accedat; cùmque prætereà, in auxilium arcessitus, Medicus, morbi causam difficillimè detegat, detectam verò, sæpè, vel arte levare, vel omninò depellere possit; operæ pretium me facturum putavi, si, quâ potuerim curâ, morbi naturam et causas exploraverim.

Argumentum est, prætereà, nondum ab auctoribus tractatum, eo ordine et còpia quam ejus magnitudo requirit.

Quanquam enim dysphagiæ plurima exempla insignia a scriptoribus, suis in commentariis et in actis societatum, memoriæ prodantur; illa tamen adeo a se invicem sejuncta et diffusa sunt, ut Medicus notitiam eorum necessariam

cellariam et optatam, nisi innumeris ferè libris evolutis, invenire nequeat.

Confilium, hanc ob causam quoque, cepi; spe, remedia quædam et administrandi modum, Medicis vel parum cognita, vel saltem in lucem nondum edita, proponendi; quibus nonnullæ dysphagiæ species, vel sanari, vel saltem minùs periculosæ reddi possunt.

Quo dysphagiæ causæ magis perspicuæ fiant, corporis partes quæ deglutitioni inferviunt, et devorandi modus, imprimis explicanda.

## DE OESOPHAGI SITU.

Tubus quo cibus ex ore in ventriculum devehitur, ab anatomicis Gula vel Oesophagus vocatur.

Canalis

Canalis cylindraceus est : a parte pharyngis inferiore incipit : ponè tracheam, secundùm vertebrae, per thoracem, in abdomen descendit.

In thorace inter lamellas mediaſtini poſterioris, unde latera ejus tunicam accipiunt, iter tenet : deinde dextrorſum vergit a quinta ad nonam uſque vertebram, ut via libera aortæ pateat : poſtremò, paululùm antrorſum inclinans, diaphragma perforat, et ventriculo jungitur.

Situs tamen œſophagi, corporis poſiturâ, pulmonum tracheæque pondere, partium vicinarum morbis, maximèque aneurifmate aortæ deſcendentis, mutari poteſt.

Oeſophagus rariffimè in duas partes eſt diviſus \*.

DE

---

\* Vid. LIEUTAUD. Hiſt. Anat. Med. vol. ii. p. 313.



## DE OESOPHAGI TUNICIS.

Plures tunicæ œsophago propriæ sunt ; quarum extrema est cellulosa, et eum spinæ dorsi a parte posteriore, tracheæque ab anteriori, adjungit.

Intra hanc, duæ musculosarum fibrarum lamellæ diversæ sunt, quarum exterior in longitudinem exporrigitur, interior transversa aut circularis est \*.

Tunica Quarta Nervosa vulgò nominatur, sed est Cellulosa potiùs ; laxis enim fibris, et cellulis constat, quibus tunica musculosa tunicæ interiori necitur.

Tunica interior plicas habet plurimas longitudinales ; quæ, dilatato œsophago, ferè evanescunt ;

---

\* Vid. Tab. I. fig. 1, 2, 3, et 4.

evanescunt ; remisso verò eo, se ostendunt \* ;  
Hinc, œsophagus bolo majori devorato sine  
injuria se accommodat. Plicæ tales œsopha-  
go ovino, bovino, testudinis, et aliorum ani-  
malium, œsophago, propriæ sunt, et multò ma-  
jores quàm humanæ.

Tunicæ intimæ plurima sunt foramina, un-  
de liquor mucosus, œsophagum lubricandi et  
cibi descensum faciliorem reddendi causâ, ef-  
fluit.

In bobus ovibusque, quibus ruminatio est,  
œsophagi fibræ musculosæ sese invicem, more  
linearum literæ X, decussant † ; ac mirâ, in-  
de, celeritate graminis buccæ intra œsopha-  
gum descendunt ascenduntque.

DE

---

\* Vid. Tab. I. fig. 5.

† Vid. Tab. II.

## DE VASIS OESOPHAGI SANGUIFERIS.

Oesophagus, per totum suum decursum, ramulos ab arteriis vicinis; hinc ab aorta descendente intra thoracem, accipit.

## DE OESOPHAGI NERVIS.

Oesophagi nervi a pare nervorum octavo priuntur.

DE ABSORBENTIBUS OESOPHAGI  
VASIS.

Multa vasa lymphatica oesophago propria sunt. Intra thoracem, in glandulas conglobatas, Oesophageas dictas, penetrant; et lymphatica

phatica vasa ab hisce glandulis proficiscentia, in ductum thoracicum plerumque definunt.

Rami etiam a sinistro latere partis superioris œsophagi, deorsum in ductum thoracicum transeunt.

A dextro verò latere partis œsophagi superioris, magnum lymphaticum truncum, qui in venam dextram subclavianam terminatur, intrant.

In toto, denique, œsophagi tractu, lymphatica vasa dextri ejus lateris, cum sinistris anastomosi conjunguntur.

### DE ACTIONE DEVORANDI.

Hæc autem minimè simplex est; duobus enim diversis conatibus constat, quorum altero cibus in gulam, altero per gulam in ventriculum, depellitur.

Animalia

Animalia herbivora, etenim, capite ventriculo inferiore pascuntur, hominesque capite inverso potum haurire possunt; indè satis constat cibos in ventriculum pondere suo solo haud descendere.

Musculis igitur huic consilio inservientibus, resolutis, aut spasmo correptis, vel transitu ab ore in gulam coangustato, devoratio difficillima evadit, aut omninò aboletur.

## DE DYSPHAGIÆ CAUSIS PRÆCIPUIS.

Causæ dysphagiæ præcipuæ (eis quæ ex mala partium fabrica oriuntur exceptis) hæ sunt.

Imò, Corpora extranea ingesta viam cibi per œsophagum impedientia.

2dò, Oesophagi iter partium vicinarum tumore, duritie aut pondere, angustum redditum.

3tiò, Oesophagi inflammatio.

4tò, Inflammati oesophagi effectus.

5tò, Oesophagi spasmus.

6tò, Oesophagi paralyfis.

7mò, Venena in oesophagum aut ventriculum admissa; vel materia intra ventriculum fermentatione nata.

8vò, Oesophagi vulnera, vel ipse oesophagus ruptus.

CAPUT

## CAPUT PRIMUM.

Corpora pharyngem aut œsophagum obstruentia, aut acumine suo latera œsophagi penetrant, aut mole suâ deglutitioni obstant; suntque vel solubilia vel insolubilia.

Corpore in humano, multoque magis carnivoris in animalibus avibusque prædæ, licet œsophagus iis sit prævalidus, mirè dilatibilis\*, vique resiliendi gaudeat; boli cibi, aliæve res extraneæ in œsophago hærentes, maximam anxietatem, et, laryngem tracheamque prementes, aliquando subitam mortem inferunt.

A

---

\* Vid. HALLER. Element. Phys. vol. vi. pag. 98.

A WIERO\* memoratur exemplum, hominis ab ovo integro deglutito suffocati; ovum in œsophago hæsit, tracheamque compressit.

Boves haud rarò ab battatis in œsophagis eorum infixis pereunt.

Chirurgus FORSTER, urbis HULL incola, historiam dedit† piscatoris extincti per piscem Soleam vivam in œsophagum ejus irruentem; quam Patri meo, in museo ejus servandam, misit.

BURSERIUS exemplum memoriæ tradidit vermium, inter sese nexorum, ægrum suffocantium ‡.

BARTHOLIN

---

\* Vid. Tom. I. Mem. de l'Acad. Chirurg. Paris.

† Vid. *Hull Packet*, August 21. 1792.

‡ Vid. BURSERII Inst. Med. Pract. Vol. iv. p. 291.



BARTHOLIN mentionem fecit de viro qui obiit subitò convulsus, propter vitri frustum gulæ inhærens \*.

Apud auctores plurima quoque alia exempla memoriæ traduntur, cibi, vitri, nummi, acum, acicularum, plumarum, &c. gulæ inhærentium †.

Aliquando

---

\* Vid. Cent. V. Hist. 66.

† Vid. DODONÆI Obs. Med. cap. 17.

Ephem. Nat. Cur. Decur. 1. anno 1111.  
Obs. 141.

HALLERI Element. Phys. vol. vi. pag. 90.

ARCULANI Pract. cap. 57.

Edin. Med. Essays, vol. i.

RHODIUS, Cent. 12. Obs. 50. Vide etiam  
Obs. 22.

Vid.

Aliquando res tales non solum per œsophagum, verum etiam per totum canalem alimentarium, illæsis intestinis, transeunt, et cum fæcibus ejiciuntur. In Patris mei museo, globulus vitreus, a chirurgo cel. ALEXANDRO WOOD acceptus, circiter pollices tres in circuitu æquans, servatur, quique per infantem biennem sine viscerum injuria transit. Insignius adhuc exemplum servatur, viz. circini duos pollices et  $\frac{5}{8}$  longi, a puella tres annos nata, deglutiti, quique, illæsis visceribus, eodem modo ac in priori exemplo exivit. De pluribus exemplis ab aliis certior sum factus,

in

Vid. MANGETI Biblioth. Chirur. p. 302 et 322.

SWIETEN et SCHENKIUS, Lib. 2. De Suffoc.  
Obs. 1.

DIEMERBROEK. Anat. lib. 2. cap. 15.

Mem. de l'Acad. Roy. de Chirurg. tom. i.  
pag. 450.

in quibus aciculæ, corporaque alia cuspidata, canalem alimentarium permeaverunt.

Sed œsophagus, ventriculus, aut viscera, sæpè ob res extraneas deglutitas magnoperè læduntur.

Oesophagus cibo ipso nonnunquam adeo distrahitur, ut fibræ ejus musculosæ munere suo proprio fungi nequeant.

Re aliquâ in œsophago diu inhærente, non subito suffocante, contractio sæpè fit supra infraque eam : Cujus exemplum in Tab. III. fig. 1. delineatur, quo obolus in œsophagi parte media pueri novennis per quadriennium latuerat, posteaque, puero phthisi abrepto, inveniebatur.

Res quævis dura, concoctu difficilis, etiam minima, diu in œsophago aut visceribus recondita, tanquam nucleus concretis formandis, aut in ventriculo aut in intestinis inservit; multa enim concreta, in Patris mei museo servata, in intestinis reperta, ossa fructuum, veluti

luti prunorum aut ceraforum, pro nucleo exhibuerunt.

Aciculæ devoratae sanguinis vomitum nonnunquam efficiunt \* : Pruni os hæmatemesin unico exemplo lethalem effecit.

Aciculæ interdum viscera perforant, inflammationem gignunt, ac mortem inducunt †.

Aliquandoque acus ventriculum perforant ‡, indéque in alias corporis partes, verbi gratiâ, in ureterem ||, aut in vesicam urinariam §, viam sibi faciunt.

Res

\* Vid. Vol. i. Act. BERLIN. pag. 53.

† Vid. MONRO's Bursæ Mucosæ, pag. 42. Tab. X.

\* Vid. Lond. Phil. Transf. anno 1696, art. 2.

|| Vid. JUL. CESAR CLAUDINUS, Resp. Med. 40.

§ Vid. PLATER. tom. iii. lib. 2. cap. 10. De Mictione.

Vid.

Res etiam œsophago inhærentes, quæ non viis solitis transeunt, nec arte chirurgi extrahantur, nova sibi itinera faciunt\* ; undè abcessus ; incisoque abcessu, res vulgò tumoris verticem occupans facilè extrahitur†.

Res aliquando deglutitæ propè anum hærent. De viro a Patre meo certior sum factus, qui dolorem vehementissimum, cum inflammatione et tumore, circa anum sensit ; pure formato, tumoreque inciso, pure foetido  
emisso,

---

Vid. Etiam, DIEMERBROEK, Lib. Anat. cap. 173.

Etiam, MIZALDUS, cent. 1. aphor. 3.

Etiam, THONERUS, lib. 3. obs. 2.

Etiam, BONET. Med. Sept. lib. 3. sect. 29.  
cap. 25.

\* Vid. MIZALD. cent. 1.

† Vid. Mem. de l'Acad. Roy. de Chirurg. tom. 1.

emisso, os ex capite piscis Afelli dicti inventum fuit; quo exciso, brevi convaluit.

### DE DIAGNOSI.

Materia quævis in œsophago latens, ex dolore, anxietate, et suffocationis sensu, indè orto, facillimè dignoscitur.

Secundùm rei molem, devoratio et respiratio plus minúsve impediuntur; res autem permagnæ deglutitionem prorsùs tollunt.

Quo de re in œsophago latente certiùs pateat, stylo offis cete, (*ANGLIS a Probang*), ad œsophagum perscrutandum utimur.

### DE PROGNOSI.

Dum res deglutita in œsophago manet, prognosis plerumque fausta est, quoniam vel ejici vel idoneis instrumentis extrahi potest.

Si

Si verò res cuspidata insolubilis in ventriculum descenderit, prognosis incerta fit oportet.

## DE MEDENDI RATIONE.

Medendi ratio, cùm ad sanandum, tùm ad leniendum morbum, variat multùm, secundùm varios situs rerum, quæ in œsophago hærent.

Si res in œsophago latens sit soluta facilis, ut in ventriculum detrudatur, nisi immineat suffocatio, minimè opus est; a liquore enim ab œsophago secreto, lubricatâ atque mollitâ, partimque solutâ, præcipuè corpore per fomentum laxato, sponte dilabatur, vel postquàm diu in œsophago latuerit, vomitus vi ejici potest. FABRICIUS ab AQUAPENDENTE de exemplo simili mentionem fecit, in quo os,  
partim



partim dissolutum, vomitu ex œsophago expulsum fuit \*.

Res verò insolubilis existens, et respirationem etiam impediens, ex œsophago removeri debet.

Hoc fit gutture plumâ irritato ad vomitum excitandum; nec inde sequitur periculum, stimulo enim remoto, vomitus cessat.

Vel si res in œsophago infixâ totum œsophagum non implet, ut evomatur nitendum per ipecacuanham aut antimonium tartarifatum, vel per emetica præsentiora, uti zincum vitriolatum, cuprum vitriolatum, et flavum hydrargyri oxidum.

Si emetica æger deglutire nequeat, per anum injici oportet.

Hoc consilio antimonii tartarifati solutio, vel nicotianæ infusum, adhibetur; hoc infusum

---

\* Vid. Op. Chirurg. cap. 39.



fufum autem, nifi cautiffimè adhibetur, periculofum eft.

Propter confenfum quoque infignem inter cutem, ventriculum et viscera, vomitus, nicotianæ infufo, cuti illito, excitari poteft.

Apud veteres mos fuit, alvum, pedibus immerfis in hellebori infufo, purgare.

Viam longè diverfam emeticorum exhibendorum tentabat SCHMUCHER, in cafu militis cujus in gula cibi buccæ inhæferat, qui neque furfum nec deorfum pelli poterat : Ille folutionem antimonii tartarifati in brachii venam infudit, et femihora poftèa cibi bolus vomitu ejiciebatur \*.

In primis tomis Aëtorum Societatis LONDINENSIS, fcriptisque HALLERI, multa traduntur experimenta, undè verifimile fit, remedia cathartica et emetica fanguinis maffæ immixta,

---

\* Vid. Miscell. Chirurg. vol. i. pag. 335.

ta, eisdem effectus ac ore data producere \*. Horum tamen semper est summum periculum, et propter medicamenti vires, et propter aëra simul cum eo in venam receptum; multa enim traduntur exemplà, in quibus lactis vel puris etiam paucillum in venam infusum, mortem animali intulerit.

Remedia quædam volatilia, nec ore recepta, nec per anum injecta, eodem modo agunt; et sic vomitus excitari potest.

BALTHAZZAR GLASSIUS † rem metallicam quæ primò in œsophago hæserat, et postea in ventriculum descenderat, solvere tentabat.

Hoc

---

\* Vid. etiam REGNAUDOT Differt. Med. Inaug. de Chirurg. Infus. renovand. LUGD. BAT.—Etiam vide FRIEND. Emmenalogia.

† Vid. Mem. de l'Acad. Roy. de Chirurg. PARIS. vol. i. pag. 538.

Hoc confilio, puero qui plumbum devoraverat, acetum destillatum, quo plumbum solvitur, et in cerussam acetatam mutatur, præscripsit. Hoc autem non solum propter alia mala ab aceto destillato in internam teneram et mobilem œsophagi tunicam periculosum est, verum etiam quia cerussa acetata ut venenum in corpus humanum agit.

Hoc autem modo, aurum, argentum, aut plumbum, in œsophago hærens, hydrargyro infuso amoveri aut molliori possunt; ita in ventriculum facilius dilabentur, undè vomitu aut ano ejici possunt: et, sine dubio, constrictis intestinis, hydrargyrus magnâ copiâ, sine ullo malo, adhibitus fuit.

His remediis infelicitè tentatis, instrumentis chirurgicis uti debemus.

Forcipe recto res in gutture facile extrahi potest. Re autem altius in œsophagum immersâ, forceps curva, manu dextrâ Chirurgi præhensâ, ac indicatore sinistræ manus rectâ,

accommodatior

accommodatior est ; sic enim cibi, aut cujuscunque alius rei frustum, circa epiglottidem fixum, extrahi potest.

Pro nummi ex œsophago extractione, os cetaceum longum, cui duo tenacula obtusa nectuntur \*, quale Pater meus fabricari curavit, multis abhinc annis, ac prælectionibus suis monstravit, adhibendum est.

Dum enim tenacula ultra nummum transmissa ac dein retracta, huncprehendunt, œsophagi latera cavent ne nummus ex tenaculis elabatur ; atque nummus ipse, quoque, a tenaculis œsophagum defendit.

Ad

---

\* Vid. Tab. IV. fig. 1. vel fig. 2. Pars talis instrumenti cetacea debet esse viginti pollices longa, ut ad ventriculum pertingat, ac ne dilabatur e manu Chirurgi, quod reverà in unico saltem exemplo accidisse videtur, et ægro mortem intulisse. — Vid. Tom. i. Mem. de l'Acad. Roy. de Chirurg. PARIS.

Ad ossa ex œsophago extrahenda, Dr STEDMAN instrumento ad utramque finem curvutebatur; et ad hami extremum, ne læderetur œsophagus, globulum ritè apposuit\*; si enim hami extremum acutum fuerit, resque in œsophago inhærens haud magnæ molis, adeóve mollis ut instrumenti mucro ibi infixi nequeat, periculum est ne œsophagus ipse vulneretur; memoraturque exemplum†, in quo œsophagi ipsius pars, ab hujuscemodi instrumento evellebatur.

Dr PERROTIN filo ferreo implicuit, atque extraxit, os in œsophagum infixum.

Dr G. CLEGHORN, summâ arte, plumam puellæ e gutture, per os cetaceum, vittâ circumdatum, extraxit‡.

D

Res

\* Vid. Edin. Med. Essays, vol. i.

† Vid. Mem. de l'Acad. Royale Chirurg. PARIS. tom. i.

‡ Vid. Lond. Med. Obs. vol. iii. pag. 7.

Res autem parvæ, veluti acus, œsophago inhærentes, multò difficiliùs extrahuntur ; et alii scriptores alia instrumenta, tanquam consilio huic maximè accommodata, laudaverunt.

In Tab. IV. fig. 5. delineatur instrumentum, quod Pater meus dudum fabricari direxit, quo acus vel ossa parva ex œsophago extrahi possunt. Hoc instrumentum ex stylo cetaceo constat ; ad extremum cujus, forceps parva, e chalybe fabricata, infigitur ; depri-mendo annulos ei adaptatos, partes forcipis comprimuntur.

Hoc instrumento in œsophagum immisso, sedeque rei in œsophago latente inventâ, fistulâque subductâ, forceps vi resiliendi sese aperit ; reque inter forcipis partes inclusâ, repri-mendo fistulam remprehendemus.

PETIT ad hanc rem instrumentum quodammodo simile ei DOCTORIS PERROTIN fabricavit ; eoque iudice, acus per hoc facilè extrahi possunt, undequaque enim movetur. Hoc instrumentum



strumentum ex longo osse cetaceo constat, cui annuli plurimi inferuntur \*.

DE LA HAYE ad parva ossa extrahenda, instrumentum sibi proprium feliciter adhibuit, quod his verbis describitur † : “ Il prit un filet  
“ d’argent, long et très flexible, (c’étoit celui  
“ de la plus longue de ses algalies) ; il passa,  
“ dans l’anneau qui termine ce filet, plusieurs brins de filasse assez fine ; il forma  
“ plusieurs lacs de toute la longueur de cette  
“ filasse ; il introduisit ce filet dans l’œsophage ; lorsqu’il l’eut placé au delà du  
“ corps étranger, il le retira doucement, en  
“ lui faisant faire des demi-tours à droit et à  
“ gauche, afin d’engager l’épingle dans le  
“ paquet de lacs formés par la filasse : Et ce  
“ procédé

---

\* Vid. Mem. de l’Acad. Roy. Chir. PARIS. tom. i.

† Vid. Mem. de l’Acad. Roy. Chir. PARIS. tom. i.

“ procédé ingénieux lui reussit fort heureuse-  
ment.”

Ut res in œsophago hærentes removeantur, in hisce præcipuè exemplis in quibus œsophagus haud omninò obstruitur, spongia in extremo ossis cetacei a PETIT\* fixa, laudatur. Nisi autem spongia fistula includatur, et simul cum fistula ultra rem in œsophago hærentem introducatur, ne eam in ventriculum impellat periculum est.

Spongiâ ita intromissâ, madefacienda est ut tumeat, aquâ per fistulam infusâ ; tunc fistula primò extrahatur, et postea os cetaceum cui spongia udâ redditâ affigitur ; plures forsitan post conatus, res, in œsophago infixâ, extrahi potest.

Ab hisce verò instrumentis diversis, acus, aliaque corpora, ne in ventriculum impellantur

---

\* Vid. Mem. de l'Acad. Roy. de Chirurg. PARIS.  
tom. i. p. 491.



tur cavendum; res enim in œsophago hærentes, eis instrumentis æquè facilè in ventriculum impelluntur, ac extrahuntur; indè dolor, multique alii morbi, originem trahunt.

Ut de hac re præcaveatur, fistulam coriaceam, longum os cetaceum tegentem fetis plurimis obfitum, fabricandam curavi\*. Os hoc cetaceum in œsophagum detruditur; eo-que altè detrufo, subducenda est fistula, et acus ut indè tollatur aggrediendum; per fetas eam prehendere conamur, et post plures conatus fortassè deprehendemus.

Vice fetarum, partes gummi elastici ossi cetaceo figi possunt, et hæ quoque fistula tegi.

Dominus JARDINE, Classis Regiæ Chirurgus, instrumentum ad acus ex œsophago extrahendas probè excogitatum, ad Patrem meum misit. Ex ossè cetaceo, cui plicæ plurimæ  
florum

---

\* Vid. Tab. IV. fig. 3.

florum ex intestinis felinis circumdantur, cori-  
flat; eoque in œsophago ritè posito, visceris  
felini plicæ illæ extrorsum per fistulam hoc  
os cetaceum includentem, ut nodus forme-  
tur\*, premuntur.

Instrumentum quodammodo simile, in Tab.  
V. fig. 3. delineatur.

Conatibus omnibus ad rem extrahendam  
nihil valentibus, ea in ventriculum impelli  
debet.

Rerum emollientium in œsophagum infu-  
sio a RIEDLINO†, experientiæ fide, lauda-  
tur.

Nisi res autem tales cautè injiciantur, ne  
œsophagi fibræ musculosæ distrahantur aut  
torpidæ reddantur, metuendum est.

Remedium

---

\* Vid. Tab. V. fig. 1. et 2.

† Vid. LIN. Medic. ann. 2. Octob. art. 3.

Remedium autem præsentius est, ut oleum copiosè et quàm citissimè æger bibat; hînc lubricatur œsophagus.

Æger quoque in balneum tepidum descendat oportet; et opio, vel ore vel enemate dato, tumor et tensio, quo corporis infixi descensus in ventriculum faciliior fiat, minui possunt: Eodem modo ac urethra spasmo laborante, olei injectio si non spasmus superet, candelæ medicatæ introitum faciliorem reddit.

Ad res in ventriculum impellendas, spongia ossi cetaceo affixa in usum plerumque vocatur. Ad idem consilium globulus plumbeus ad extremum fili ferrei fixus a PETIT adhibetur, et instrumenta similia a VERDUC \* et aliis laudata et adhibita. Sed sphæroides † ex eburno confecta

---

\* Vid. Op. Chirurg. cap. 25.

† Vid. Tab. IV. fig. 4.

confecta, et oleo inuncta, ob lævitatem suam, huic consilio melius inservit.

Re insolubili in ventriculum detrusâ, transitus ejus per intestina facilius erit, si æger magnâ copiâ lini infusum, gummi Arabici mucilaginem, et medicamenta similia, bibat ; et quoque, per hæc, intestina minùs obnoxia sunt injuriæ ex rebus acutis ibi latentibus.

Tunc WINSLOW præceptis obtemperandum. WINSLOW, ut ægrotus primò in dextrum latus, deinde in dorsum reclinet, suadet, eo consilio quoniam pylorus retrorsum patet, ut res in ventriculo inclusa promptiùs in duodenum transeat ; pylorus autem, cum custodis januæ munere, vi musculosâ sphincteris sui, accuratè fungatur, talis corporis situs minùs fortassè quàm credidit auctor celeberrimus valet.

Postremò, ad remedia purgantia drastricta confugiendum est, ut viâ corpori extraneo per anum pateat.

Re in gutture hærente, ore extrahi et in ventriculum impelli recusante, ægrique suffocatione imminente, ad rem extrahendam incidendus est ipse œsophagus.

Hæc operatio a GUATANNI \*, et ab aliis, sine lethali exitu instituebatur ; et, libro suprà notato, duo exempla felicissima hujusmodi in corpore humano perfecta, memorantur.

Si hanc operationem experiri velimus, hoc modo progrediendum :

Secetur cutis juxta tracheæ latus finistrum ; tum trachea cum musculis tegentibus, et musculo sternomastoideo, a se invicem, digitis vel hamis obtusis distrahantur ; nervis, dein, primariis, ac vasis magnis, cautè evitatis, incidatur œsophagus secundum longitudinem, ut materies eo inclusa removeatur.

E

Si

---

\* Vid. Mem. de l'Acad. Royale Chirurg. PARIS. tom. iii. pag. 14.

Si vas majus vulneretur, ligaturâ statim comprimi debet.

Vulneris curatio summam solertiam requirit; capite fixo manente, donec perficiatur cura; ægroque interea enematibus nutrito.

---

## CAPUT SECUNDUM.

Iter quo cibus ex ore in ventriculum transit, partium vicinarum tumore, aut duritie auctâ, difficile redditur, aut prorsus impeditur.

Dysphagia ex linguæ\* et pharyngis morbis, veluti ex tumoribus, vel linguæ ipsius, vel sub lingua nascentibus, originem ducere potest.

Exemplum

---

\* Vid. Ephem. Nat. Decur. III. Anno III. Obs. 157.



Exemplum infigne ranulæ congenitæ, ex ductu glandulæ maxillaris inferioris finistræ obstructo et dilatato, dysphagiam inferentis, Pater meus conspexit : in hoc, lingua ita sursum premebatur, ut dentes medii incisores quartam pollicis partem a se invicem distarent, ac vocem distinctam proferre nequiret æger.

Hic tumor a Patre meo et cel. BENJAMINO BELL incisus fuit ; vulnerique, ductui glandulæ maxillaris inferioris illato, inserto tubo argenteo, convaluit æger.

Lingua quoque, ex inflammatione oris, palato vel genæ interdum adhærescit.

Tumores quoque, quales polypi magni, naso aut gutture nati aut indè pendentes\*, dysphagiam efficiunt. Et idem vitium causam suam tumores in ore natos agnoscit ; ita materies

---

\* Vid. Tab. VI. et VII.

teries ossea, ex inferiore maxilla orta, totum ferè os impleffe memoratur\*.

In amygdalarum inflammatione, suppuratione, tumore, earumve schirro †, faucium isthmus justò angustior fit; undè dysphagia. Morbus quoque sequitur quando uvula peccat ‡, vel glandulæ palati morbosæ redduntur. Ex palato etiam perforato, idem vitium oritur ||.

Lue

---

\* Vid. Mem. de l'Acad. Roy. de Chirurg. PARIS. tom. v.

† Exemplum tale in Tab. XIII. delineatur.

‡ Vid. Ephem. Nat. Cur. Decur. II. Ann. V. Obs. 5.—Vid. etiam, MEEKREN Obs. Med. Chirurg. cap. 12.—Et exemplum simile in museo Patris mei servatur.

|| Vid. MORGAGNI, Epist. xlviii. art. 60.

SAUVAGES. Nosolog.



Lue venerea palatum osseum sæpè deletur ; hominemque novi, qui argenteo cuneolo palati foramen obturavit.

Exostoses magnæ ex osse hyoide, interdum devorationem impediunt. Osseo-cartilaginofus tumor alterius cornu ossis hyoïdis, pilâ eburneâ (ANGLIS *a billiard-ball*) major, dysphagiæ fimul ac spirandi angustiae causâ, carptim a Patre meo et BENJAMINO BELL exsectus fuit, summo cum ægri levamine.

Dysphagiam a luxatione cornu ossis hyoïdis, memorat VALSALVA ; ægerque, reductâ luxatione, convaleuit \*.

DESSAULT exemplum aliud notabile dysphagiæ memorat ; adolescentis, qui vitam suam abrumpere volens, glandem plumbeam  
per

---

\* Vid. VALSALVA de Aure, c. 2. 20.

per scloppum minorem (ANGLIS *a pistol*) sibi in os immisit \*.

Dysphagia sæpissimè oritur a morbis epiglottidis, sicut ejus inflammatione†, erosione ‡, induratione ||, vel ligamento ejus nimis curtato § ; aut epiglottide ipsa offeâ factâ, undè ea dysphagiæ species quæ tussiculosa ¶ appellatur, quæque ægri timore, ne potus assumptus in tracheam transeat, HILDANO judice, auge-  
tur.

Luxationem

\* Vid. Journal de Chirurg. vol. i.

† Vid. MAYNWARING, Med. Facts and Obs. vol. i.

‡ Vid. SCHURIG. Chylologia, pag. 257.

|| Vid. BONET. Sepulch. Lib. III. Sect. iv. Obs. 6.

§ Vid. Act. Nat. Cur. Vol. vi. Obs. 26.

¶ Vid. SAUVAGES. Nosolog.

Luxationem epiglottidis dysphagiæ causam aliquando dare, a nonnullis affirmatur \*.

Laryngis morbi, veluti cartilaginee ejus luxatæ †, aut tumores indè nascentes, idem efficere solent ‡.

Glandularum lymphaticarum colli moles aucta ||, vel nimia circa œsophagum pinguedo collecta, aut glandulæ bronchiales et œsopha-  
geæ

---

\* Vid. Ephem. Nat. Cur. Centur. III. et IV. Obs. 112.

† Vid. Act. Nat. Cur. Vol. vi. Obs. 90.

‡ Vid. Ephem. Nat. Cur. Decur. II. Anno II. Obs. 116.

|| Vid. Gooch's Survey, Vol. ii. p. 120.

Etiam, DE HAEN, De Deglut. læsa, pag. 7.

Etiam, RHODIUS, Cent. II. Obs. 47.

geæ \* grandiores factæ, devorationem impedire possunt.

Tumores strumosi †, steatomataque ‡, idem vitium interdum inducunt.

Materia quoque inter vertebrae cervicales cumulata, vel vertebrarum cervicalium curvatura, eidem morbo ansam præbent.

In spina etiam ventosa, vertebrae præter naturam tumentes, pharyngem et œsophagum comprimunt, et dysphagiam inducunt: cujus rei exemplum a Patre meo visum fuit.

In nonnullis casibus, in quibus homines, gutture secto, mortem sibi ipsis consciscere volunt,

\* Vid. MORGAGNI, Epist. xxviii. art. 16.

† Vid. BRESL. SAMML. 1722. pag. 399.

‡ Vid. Act. Nat. Cur. Vol. vi. Obs. 149.

Etiam, FAB. HILDAN. Cent. II. Obs. 44.

Etiam, Edin. Med. Essays, vol. iii. p. 322.

lunt, ipse œsophagus aliquando fecatur; vel, si ligamentum latum, os hyoides cartilagini thyroideæ conjungens, fecetur, larynx in dorsum spinam recidet, dysphagiamque inducet.

Glandula thyroidea tumefacta, quod in bronchocele fit\*, impeditam deglutitionem sæpè facit.

Glandularum lymphaticarum nonnullæ, eæ præcipuè intra thoracem sitæ, adeò œsophago vicinæ sunt, ut, si magnoperè tumeant, ipsarum moles œsophagi cavum justò angustius reddat.

Devoratio impedita ex ipsius cordis palpitatione, a Doctore MEAD evenire dicitur.

Oritur quoque dysphagia ex aortæ descendentis aneurismate. Pater meus et chirurgus cel. ANDREAS WOOD, hujus exemplum insig-

F

ne

---

\* Vid. DE HAEN de Deglut. læsa, exemplum secundum.

ne viderunt; in quo, ob ingentem sanguinis copiam intra aortam coacti, devoratio difficilis evasit, atque aëris in finistrum tracheæ ramum introitus penitus ferè interclusus est \*.

Curfus arteriarum ex aortæ arcu orientium infolitus, ansam dysphagiæ dare potest. Exemplum in Tab. IX. delineatur; in quo, arteria subclaviana dextra, carotide dextrâ et finistrâ, et subclavianâ finistrâ, ex aortæ arcu derivatis, oritur paulò infrâ arteriam subclavianam finistram, et ponè tres alias arterias et tracheam transit ad dextrum latus †.

Oritur

---

\* Vid. Tab. VIII.

Etiam, DODONÆUS, Annot. cap. 30.

Etiam, BENIVENII, de Abditis.

Etiam, MORGAGNI Epist. 17. et 18.

† Vid. etiam, Mem. of the Med. Soc. of LOND.  
vol. ii.

Oritur quoque dysphagia ex aneurismate arteriæ carotidis communis \*.

Tumores inter tracheam et œsophagum †, vel abscessus pharyngem aut œsophagum comprimentes, dysphagiæ ansam dent. Exemplum in Tab. X. delineatur ; in quo, parte pharyngis superiori exesâ, materies purulenta in laryngem evasit, et ægram extinxit ‡.

Insigne memoratur exemplum a Domino LUDLOW, quo facci præter naturam facti cum œsophago commercium habuerunt, cibusque ferè omnis devoratus in hos faccos transiit ||.

Viscera

---

\* Vid. WERNERI Epist. gratulatoria. LIPS. 1776.

† Vid. N. Aët. Cur. Vol. v. Obs. 24.

‡ Vid. N. Aët. Nat. Cur. Vol. v. Obs. 24.

|| Vid. LOND. Med. Obs. and Inq. vol. iii. p. 85.



Viscera thoracis \*, aut abdominis †, magnoperè tumida, devorationem difficilem sæpè reddunt ‡.

De his autem morbis levandis aut sanandis, opusculi fines arcti, etiam leviter tractare nos vetant.

## CAPUT

---

\* Vid. Com. Van GEUNS, Act. HAARLEM. p. 77.

† Vid. MORGAGNI de Sed. et Caus. Morborum, Epist. xxviii.

‡ Vid. MORGAGNI de Sed. et Caus. Morborum, Epist. xxiii. art. 4.

Etiam, Van SWIETEN. Comment. ad § 797.  
pag. 649.

---

---

### CAPUT TERTIUM.

#### DE OESOPHAGO INFLAMMATO, DYSPHAGIAQUE INDE NATA.

Iter ex ore in ventriculum rebus externis, sicut corporibus acutis, calidis, fluidisve acrioribus ingestis, inflammationi obnoxium fit; hinc justò mobilius evadit, simulque cavum ejus propter tunicas contractas et condensatas angustior redditur.

Oesophagi quoque inflammatio a morbis totius corporis, veluti phlegmasiis, cynanche tonsillari, maligna, pharyngea, et parotidea, induci forsitan potest.

Oesophagus quoque in CULLENI exanthematibus adeò inflammatur, aut adeò aphthis oblitus est, ut devorationem recuset.

Inflammatio

Inflammatiō ex variola orta, impedimentum devorationi inferre potest : Hoc vitium, uvulam aut velum palati pendulum pustulis obfitum, tanquam causam suam agnoscit.

Dr GREGORY, prælectionibus suis, exemplum in quo eruptio *pemphigosa* ex ore in guttur diffusa, transitum cibi per œsophagum impediēbat, sese vidisse memorat.

Deglutiendi quoque difficultas in extremo phthiseos gradu aliquando occurrit. In hoc, morbisque quibusdam putridis, dysphagia, partim gutturi et œsophago tenerioribus factis, et partim gutturi propter frequentem excreationem excoriato, tribuenda est ; hinc omnium ægri conatuum devorandi, dolor urgens comes est.

Tale devorandi impedimentum, partim œsophagi inflammationi, aut conditioni ejus irritabili, partim ægri imbecillitati, tribuendum.

Oesophagi

Oesophagi quoque inflammatio hydrophobiam comitatur \*. Mulierem hoc morbo favissimo laborantem, egomet vidi; circiter octo post morsum acceptum vixit hebdomadas; inciso cadavere, nihil morbosum præter oesophagi inflammationem inventum.

## DE OESOPHAGI INFLAMMATI DIAGNOSI.

Difficillimè inter oesophagum et pharyngem inflammatum distinguitur: Oesophago autem inflammato, dolor multùm devoratione augetur, et usque ad ventriculum pertingit; prætereà, gutturis inspectione, sese non ostendit.

DE

---

\* Vid. BOERH. Aphor. ab aph. 1128 ad 1147.

Etiam, Obs. HILLAR. pag. 248.

## DE PROGNOSI.

Oesophagi inflammatio, propter distributionem cæterorum ramorum paris vagi octavi nervorum super partes vitales ac canalem alimentarium, multò periculosior, eâ qua alia corporis organa ejusdem magnitudinis sensûsque afficiuntur, esse videtur.

## DE MEDENDI RATIONE.

Oesophagi inflammatio plerumque sanatu facilis est. Inflammatio enim, tensio, et tumor oesophagi, tantum doloris præcipuè ægro inter devorandum pariunt, ut ipse cibum solidum, ante inflammationem magnoperè levatam, sumere nolit. Ægro autem in conatibus suis devorandi perseveranti, spasmi aliquando, sumpto etiam cibo mitissimo, oriuntur.

Ne

Ne augeatur inflammatio, remedia antiphlogistica adhibenda sunt.

Hirudines, collo applicatæ, præsens auxilium afferunt. Vescicatoria quoque in hac, sicut in aliis inflammationibus, forsitan proderunt. Ex hirudinibus aut vescicatoriis ad partem thoracis posteriorem, propè spinam, quo sanguinis impetus in vasis ex aorta descendente natis minuatur, haud procùl ab arteriis œsophageis appositis, maximum commodum sperare licet. Nec diaphoretica mitiora simul cum vescicatoriis rejicienda,

Unà cum his remediis, gargarismata emollientia, velut althææ decocta, lini infusa, tepidi quoque vapores in tracheam et pulmones inhalati, maximè valent: trachea enim, vasa sua, nervosque, ex eisdem radicibus ac œsophagus habet.

Balneum tepidum quo removeatur dolor, minuaturque œsophagi tensio, inflammationem etiam minuit.

---

## CAPUT QUARTUM.

### DE DYSPHAGIA QUÆ EX PHARYN- GE OESOPHAGOVE PRIUS INFLAM- MATIS ORIGINEM TRAHIT.

Durante igitur œsophagi inflammatione, latera œsophagi opposita interdum concre-  
cunt \*. Suppuratio quoque brevi aliquando  
supervenit, fitque abscessus, qui mole suâ œso-  
phagum totum obstruit.

Van DOEVEREN exemplum memorat, in  
quo, inter vertebrae spinæ œsophagique par-  
tem

---

\* Vid. Act. HAFN. Vol. i. Obs. 109. (Ex Variola.)

Etiam, BLANCARD. Collect. Med. Phys.  
Cent. iii. Obs. 54.



tem posteriorem, abscessus natus fuit, qui omnem cibi per œsophagum descensum impedit \*.

Acuta quoque et insolubilia in œsophago hærentia suppurationem ei nonnunquam inferunt †.

ROESLERUS de puella mentionem facit, cuius in gutture hæsit pruni os, quæque materiem sanguinolentam expuere solebat; eadem tamen febrim, devorandi difficultatem magnam, et convulsiones, passa, os illud tandem tussi eiecit ‡.

Materies

---

\* Vid. BLEULAND. de sana et morbosa Oesoph, Fabr. pag. 53.

† Vid. MORGAGNI, Epist. xv. art. 15.

‡ Vid. BONET. Med. Sep. Lib. III. de Oesophagi Affectibus.

Etiam, PLATER, Obs. lii. pag. 413.

Materies purulenta in earundem partium cellulosa substantia collectâ, subito aliquando in earum cava erumpit ; indéque in laryngem transit, et ægrum suffocare minatur, aut reverà suffocat. Hoc pauperi cuidam evenit, qui, post frigus diuturnum, dolorem vehementissimum gutturis et devorandi impedimentum sensit. Hac in conditione per triennium vixit. Materie tandem hujusmodi in gutture accumulâtâ, suffocatione sublatus fuit. Inciso cadavere, materia purulenta, œsophagô eroso, in tracheam viam sibi fecisse inventa est \*.

Materia quoque ejusdem generis, pulmonibus ulcere exesis, in œsophagum erumpere potest †.

Cibus

---

\* Vid. Tab. XI.

† Vid. KEIR in Med. BEYTRAGEN, L. n. II.

Cibus ipse aliquando non in ventriculum, sed in partem œsophagi erosam transit; inque saccis præter naturam factis, quique materiem purulentam continent, reconditur\*.

Oesophagus, in morbis totius corporis, ut in cynanche pharyngea, aliisque morbis, sæpè in suppurationem abit.

Oesophagus quoque, æquè ac aliæ corporis partes, inflammatione vehemente existente, gangrænæ obnoxius est; memoraturque exemplum †, in quo œsophagus totus gangrænâ affectus fuit.

Gangræna

---

\* Vid. Vol. ii. LOND. Med. Obs. and Inq.

Etiam, BURSERII Inst. Med. Pract. vol. iv.  
pag. 292.

† Vid. Monthly Review, vol. 61.

Gangræna quoque ab instrumenti in œsophagum sæpè detrufi, irritatione \*, aut materia calida aut acri in guttur aut œsophagum recepta, oritur : Cujus rei GREGORIUS illustrissimus exemplum insignè mecum communicavit, puellæ quæ, acido sulphurico forpato, quatuordecim exindè diebus elapsis, magnam œsophagi partem vomitu ejecerat.

Inflammatiò, comitante condensatione et œsophagi duritie, ejusdem angustiam inducere potest. Hæc verò angustia nonnunquam sine insigni callo fit ; eodem modo ac intestinorum *intus-susceptio* eorum stricthuram, sine duritie multa, aliquando efficit.

Oesophagi constricti multa traduntur exempla, quorum insignissimum memorat SAMPSONIUS,

NIUS,

---

\* Vid. Mem. de l'Acad. Royale Chirurg. PARIS. tom. i. pag. 530.

NIUS \*, quo, ægro inediâ perempto, et cadavere dissecto, œsophagus adeò contractus visus est, ut fetæ porcinæ vix capax esset.

Oesophagus induratus unico loco contrahitur, dum pars loco constricto proxima magno-  
perè dilatatur †: Eodem modo ac in urethræ stricturis aliqua canalis hujus pars ampliatur.

Membrana œsophagi interior, per duos aut tres pollices, ubi pharyngis ad formandum œsophagum contractio fit, aut propè ventriculum, sæpè densatur ac coarctatur ‡.

Sed

\* Vid. Miscell. Curios. anno 1613. Obs. 170.

† Vid. Tab. XI. lit. F. — Vid. etiam, BURSERII Inst. Med. Pract. vol. iv. pag. 292. — Etiam, ODIER, in EDIN. Med. Com. vol. iii. — Etiam, WILMER'S Surgery, p. 94.

‡ Vid. TRILLERI Dissert. de Fame lethal. ex callo Oris Ventr. — Etiam, HALLERI Collect. Diss. Pract. tom. iii. pag. 31. — Etiam, Sepul. Anat. lib. 3.

Sed absorptio quoque fibrarum musculosarum, et materie callosæ aut ossæ suppositio, inflammationem ejus sequi possunt\*.

Indè hæc induratio non solum vi mechanicâ cibi transitum impedit; sed, fibris musculosis solutis, buccæ interdum partem morbosam attingit, citòque ore rejicitur.

Tumores, secundum ipsorum situm et originem, devorationem aut vomitum plus minusve difficilem reddere possunt.

Oesophagus aliquando partim angustatur, partim carne quadam nascente spongiosâ adimpletur; et pars angustata æquè dura ac cartilago fit.

Tales annuli in partibus œsophagi diversis formantur. Pater meus exemplum annulorum talium propè ventriculum nascentium, tuberisque spongiosi in parte œsophagi interiori,

---

\* Vid. METZER, *Advers. Med.* vol. i. pag. 175.



riori, vice valvæ fungentis, conspexit. Cibus ferè omnis e ventriculo prohibebatur, ægro intereà facilè vomente. Oesophagus aliquando ulceratione carcinode afficitur. Guttur quoque simili modo lue venereâ læditur. Exemplum sunt innumera tumorum in oesophago natorum, (Vid. Tab. VI. VII. et XII.), aut a partibus vicinis in guttur pendentium, quæ chirurgiâ solâ curantur.

## DE CAUSIS EXCITANTIBUS.

Exinanitionum solitarum suppressio, sicut mensium, hæmorrhoidum, &c. a Doctore PERCIVAL et aliis ansam dysphagiæ præbere dicitur, exempla quoque opinionem hanc confirman-  
tia traduntur.

Irritationes quoque variæ oesophagum inflammant. Tumorum autem ortus causa adhuc parùm cognita. Statum quendam, ac-

H

tionemque



tionemque vaforum abnormem, eos gignere nonnulli censent.

Nicotianæ fumus, fungo aut schirro in œsophago originem dare fertur ; et habentur ii qui tali fumo gaudent, schirrho aut labii inferioris carcinomati magis quàm alii proclives.

### DE PROGNOSI.

In exemplis plerisque hoc capite memoratis, prognosis infauſta eſt ; vitia talia lenire, rarò autem radicitùs (exemplis qui operatione chirurgi levantur exceptis) removeſcere poſſumus.

### DE DIAGNOSI.

Ex doloris levamine poſt œſophagi inflammationem, ex levi tremore ſuperveniente, ſenſuque

fuque in gutture pulfus, fiti permanente, dysphagiâ perſtante, ſuppurationem factam eſſe conſtat.

Gangræna autem ſuperveniens, ex omni dolore ceſſante, fœtore, coloreque nigro materie excreatæ, ex gutturis nigræ, artuum languore et frigore, ex pulſu celerrimo et parvo exiſtente, dignoſcitur.

Affectus alii hoc capite notati, ſolùm ex modo quo devoratio fit, œſophagum offe cetaceo perſcrutando, ex ſtatu ægri valetudinis ordinario cognito, imprimis ſi luis venereæ ſuſpicio fit, dignoſcuntur.

## DE MEDENDI RATIONE.

Suppuratione poſt inflammationem ſuperveniente, ut ea cataplaſmatibus emollientibus promoveatur, et dirumpatur tumor, nitendum eſt. Aut tumore ab parte inferiori incifo,  
aſtringentiâ

astringentiâ adhibendâ, ut sanus reddatur œsophagus; dum, interim, puris in laryngem vel in ventriculum ingressus præcavetur.

Gangrenæ ortæ progressus, gargarismatibus cinchonæ officinalis cum acidis junctis, opio, et enematibus nutrientibus, ad ægrum sustentandum, adhibitis, est coërcendus. Si enim antiseptica devorantur, gulæ dolorem, inflammationemque ne augeant periculum est.

Exempla dysphagiæ nonnulla, œsophagi callo aut tumoribus inductæ, hydrargyro aliquando levata sunt.

Dr MUNCKLEY\* se plures tali œsophagi morbo

---

\* Vid. LOND. Med. Transf. vol. i.

Etiam, NAHUYs, pag. 231.

Etiam, SANDIFORT, Biblioth. Phys. Med.  
vol. ix. pag. 24.

Etiam, GEUNs, Act. HAARL. tom. xi.  
pag. 112.

morbo laborantes, hydrargyro, omnibus aliis remediis incaſum tentatis, ſanâſſe affirmat.

In pleriſque autem hujusmodi exemplis, æger nullum ex iſto remedio commodum percipiet. Hanc in mentem, non ſolùm propter tumorum analogiam intra naſum, os, pharyngem natorum, inductus ſum; verùm etiam propter exempla plura Patris mei curæ mandata, in quibus, præter argentum vivum, cicutâ, hyoſcyamoque, in uſum licet vocatis, eventus tamen infelix fuit. Indurationes itaque et ſtriſturæ œſophagi a MUNCKLEY memoratæ, ex lue venerea ſine dubio originem duxerunt.

## DE MODO TUMORIS EX GUTTURE TOLLENDI.

LEVRET polypos uterî ac vaginæ, ligaturâ excidendas ſuadet: illi tamen videbatur modum operandi, quem deſcripſit, non poſſe adhiberi

hiberi ad polypos in gutture natos tollendos \*. Quùm verò Patri meo videbatur, polypos, in locis præcipuè arctis sitos, excindi aut forcipe evelli non posse, sine gravi injuria partibus vicinis illata, hæmorrhagia enormi, ac tumoris renascendi periculo, ob radices ejus relictos, ligaturam, in omni ferè casu, excisioni aut evulsioni prætulit; atque per triginta annos elapsos, varios modos quibus secundum tumoris situm, adhiberi possit, auditoribus suis in cadavere demonstravit, argento nitrato postea polypi radici admoto, atque variis exemplis ægrotantium illustravit, in quibus, exitu secundo, operatio sic instituta erat.

Inspiciat

---

\* LEVRET, Mem. de l'Acad. Royale de Chirurg. tom. iii. p. 599. : “ Reservant d'en parler dans un  
“ autre memoire, en traitant des polypes de la gorge,  
“ pour lesquels la même méthode ne pouvant pas  
“ servir, j'en ai imaginé une autre, que je décrirai  
“ alors dans toute son étendue.”

Inspiciat lector Tab. III. fig. 2. Tab. VI. XII. et XIII. ut tumorum naturam, instrumenta his tollendis adaptata, atque operandi modum, intelligat.

---

## CAPUT QUINTUM.

Fibræ œsophagi musculosæ, nullâ etiam inflammatione præfente, nunc justò mobiliiores factæ, spasmò vel convulsionibus, ut in singultu, corripuntur; nunc paralyfi minùs justò mobiles fiunt.

Hi morbi vulgò generis nervosi affectûs esse censentur.

## DE OESOPHAGI SPASMO.

Nunc majorem nunc minorem œsophagi sensum in hominibus diversis animadvertimus.

Aquam

Aquam frigidam, cerevisiam effervescentem, spiritus ardentes, alii aliis multò faciliùs hauriunt.

Rabie caninâ, pharynx et œsophagus adeò mobiles redduntur, ut aquæ guttulâ vel minimâ ore receptâ, totum corpus vehementer convellat.

Solidorum quoque buccas majores minoresve varii homines devorant.

Corpore erecto, major œsophagi vis ad solida quàm fluida ingerenda necesse esse videtur; et, facultate devorandi deficiente, vulgò solida excipiendi facultas primò extinguitur.

Quando totum suum per cursum œsophagus spasmo laborat, motu ejus inverso aut antiperistaltico cibus magnâ vi rejicitur.

Aliis verò in exemplis œsophagi tantùm parte, scilicet inferiori, spasmo laborante, cibus, transitu in ventriculum impedito, in œsophago diu detinetur.

Senem



Senem antea sanissimum cognovi, qui bis œsophagi spasmo, per prandium correptus fuit. Primus morbi impetus, paucas post horas enemate anodyno sublatus fuit; sed impetus morbi alter, postquam tres aut quatuor dies duraverat, (enemate anodyno aliisque incassum tentatis remediis), sponte tandem cessavit.

GREGORIUS cel. mecum exemplum puellæ hysteriâ laborantis communicavit, cui dysphagia per plures dies persistens supervenit: et scintillâ electricâ per guttur elicitâ, levata fuit.

Oesophagi spasmo per scintillas electricas sublato, ventriculus gravissimè afficiebatur; sed hæc quoque ventriculi affectio, eidem remedio tandem cessit.

OOSTERDYK, de homine cui œsophagus duodecim dies spasmo afficiebatur, mentionem facit\*.

I

Æger

---

\* Vid. BLEULAND. de sana et morbosa Oesoph. Structura, pag. 56.

Æger quidam, totum per vitæ decursum, œsophagi spasmò, a Domino AIRD, laborâsse dicitur\*.

Insigne, puellæ, J. MATTHEW, œsophagi spasmò vexatæ, exemplum, in Nosocomio nostro, incunte anno 1792, se obtulit.

Hæc puella, viginti annos nata, paroxysmis epilepticis, paralyfi cruris alterius, dysuriâ, et imperfecto alterius oculi visu, laborabat. Paulò pòst, devorandi facultate minutâ, muscutorum gutturis et brachiorum spasmî superveniebant : tandèm, devorandi facultate penitùs abolitâ, ægra eandem exercere conata, convulsionibus violentis correpta fuit. Morbi initio, enemata nutrientia data fuerunt. Eodem autem ingravescente ; compertoque stylum cetaceum facillimè per œsophagum transire, cel. Dr RUTHERFORD cibum ægræ in ventriculum injiciendum

---

\* Vid. EDIN. Med. Essays, vol. i.

inijciendum curavit, ope tubi in pag. 77. descripti; et cujus, Pater meus experimentum fecerat, anno 1783, in exemplo ALEXANDRI CALLANDER, dysphagiâ, ob œsophagi constrictionem, spâsmo comitatam, laborantis, quem, cum cel. CULLENO, et Chirurgo J. MEEK, oppidi FALKIRK, curabat.

Hoc modo, vita J. MATTHEW biennium et octo menses protracta fuit.

Tubus in ventriculum bis vel ter indiès, neque dolore neque molestiâ insigni excitatis, detrusus fuit. Tandèm devorandi facultas rediit. Primò liquidâ, idque parvâ tantùm copiâ, forbere potuit: triennio jam labente, cibos solidos consumere valet.

Adhuc tamen dysphagiâ levi, brevi autem fugiturâ, subindè laborat.

Omnia remedia antispasmodica tentabat Dr RUTHERFORD; levamen autem tantùm fugax attulerunt.

Scintilla electrica etiam in hoc exemplo parùm profuit.

Egregio

Egregio Doctori RUTHERFORD, miram hanc fanationem magis naturæ quàm medicamentorum viribus tribuendam, persuadetur.

Plura autem hujuscemodi exempla memorâsse, tali in Tentamine longum foret; qui plura voluerit, is libros infrà notatos evolvat\*.

DE

---

\* Vid. ACT. HELVET. vol. ii. pag. 94.

BONET. Sepul. lib. iii. sect. 4.

HARDER, Apiarium, Obs. 40.

HOFFMAN, Differt. de Pharyng. Spasmo.

TODE, in Collect. Soc. Med. HAFN. I. n.

DE CAUSIS OESOPHAGI SPASMUM  
EXCITANTIBUS.

Habitus corporis nimis sentiens et nimis mobilis, homines spasms opportunos reddere creditur; hinc, malum foeminis, debilibus, &c. familiare.

Nexus cerebrum inter et musculos tenebris adeò obvolutus est, ut ratio spasmi certa vix ac ne vix quidem reddi possit.

DE HAEN eum animi affectibus, sicuti iræ, dolori, &c. tribuit \*.

In multis exemplis suprà memoratis, nulla animi affectio vehemens ægros turbasse videtur: actio quidem ipsa musculorum qui devotioni inserviunt, ansam præbuisse videtur; spasmus enim ægrum inter prandendum corripuit. Sæpè tamen malum consuetudine ingravescent,

---

\* Vid. Differt. de Deglutione læsa, pag. 25.

gravefcens, levioribus caufis, parùm cognitis, neque facilè obfervandis, excitatur.

### DE SPASMI OESOPHAGI DIAGNOSI.

Oefophagi fpafmi facillimè dignofcuntur, ex facultate devorandi omninò fufpenfa ; ex faucibus aridis et ficcis ; vel è quavis fubftantia, folida fluidave, inter devorandum in ventriculum tranfire recufante, et ore nafove rejecta.

Morbi natura ampliùs patet, ex ftvlo *balanario* (Anglicè *Probang*) in œfophagum detrufo, quem gula ipfa arctè quafi complectitur, et defcenfum ejus in ventriculum impedit ; vox quoque mutatur, et aliquando omninò deficit.

### DE PROGNOSI.

Quamvis morbus in quibusdam exemplis in fanitatem mutatur poft iteratos œfophagi fpafmos,

spasmos, hi tamen nonnunquam, idque graviores facti, redeunt.

Nullo morbi hujus certo remedio adhuc cognito, prognosis est plerumque infauſta. Ex ſpafmo diuturno maximum quidem imminet periculum, non ſolùm propter œſophagi canalem ſpafmo intercluſum, in quo ſtatu, teſtante AIRD\*, omnes cibum, etiam miſſimum, devorandi conatus, totum corpus convellunt, ſed quoque propter diſtributionem inſignem paris vagi octavi nervorum, quod primò in œſophagum, deinde in thoracis abdominisque viſcera, ramos ſuos mittit.

## DE MEDENDI RATIONE.

Experientia ſatis evincit hoc œſophagi vitium, medicinâ ſæpè levare non poſſe; medendi igitur ratio incerta eſt.

In

---

\* Vid. EDIN. Med. Eſſays, vol. i.



In Materia Medica plurima enumerantur remedia, Antispasmodica dicta, quorum pleraque tamen hoc nomine vix digna esse videntur.

Opium maximè valet. Oesophagi spasmodice constricti opio injecto fanati exemplum suprà memoravimus; hoc igitur remedium primò tentandum.

Proximum post opium locum tenet valeriana; dotes enim ejus salutiferæ in hujusmodi exemplis a pluribus scriptoribus haud parvi nominis, viz. J. HUNTER \*, PERCIVAL †, DUNCAN ‡, summis laudibus efferuntur.

Æther

\* “ Mr HUNTER ordered two scruples of flour of  
“ mustard, with one drachm of tincture of valerian,  
“ twice a day.” Vid. LOND. Med. et Chir. Transf.  
oct. edit. 1793.

† Vid. LOND. Transf. vol. ii. p. 90. edit. 1772.

‡ Vid. Cases and Obs.

Æther\*, cuprum ammoniacum†, quassia ‡, pomorum aurantiorum succus||, glacies in œsophagum delata §, et remedia extrà adhibita, cicuta, nimirùm, hyoscyamus, collo affricta, ad œsophagi spasmus aut leniendum aut fanandum, ab auctoribus, præcipuè a PERCIVAL ¶, laudantur.

K

Tinctura

\* Vid. EDIN. Med. Com. vol. vii. pag. 430.

Etiam, LOND. Med. Transf. vol. ii. pag. 92.

† Vid. EDIN. Med. Com. vol. vii. pag. 431.

‡ Vid. TODE, in Collect. Soc. Med. HAFN. I. n. 24.

|| Vid. N. Act. Nat. Cur. vol. v. obs. 10.

§ Vid. MONTAT. Mem. de PARIS.

Etiam, TODE, Diff. advers. Med. Pract. HAFN. 1729, pag. 14.

¶ Vid. LOND. Transf. vol. ii. pag. 90.

Tinctura cantharidum, unguentum hydrargyri, vel olea, quoque prodesse possunt.

Scintillæ electricæ quoque a Doctore DUNCAN feliciter in auxilium vocatæ fuerunt\*.

J. HUNTER exemplum memoravit†, spasmi plures per hebdomadas perstantis, aurâ electricâ fanati, in quo hydrargyrus nil valuit.

Vapores tepidi in œsophagum inspirati, a Doctore PERCIVAL œsophagi spasmus solvisse dicuntur.

Simul cum his remediis, salutiferum quoque esse potest balneum tepidum.

Hoc in morbo, devoratione impeditâ, enematis

---

\* Vid. Cases and Obs.

† Vid. LOND. Med. and Chirurg. Transf. Edit. 1793.

matibus æger nutriatur oportet\* ; quoniam, res etiam mitissimæ in œsophagum agentes, spasmos reducunt ; hic ægrum nutriendi modus, omnibus aliis remediis, in levioribus exemplis, præstat.

Vita humana, ut tradunt auctores, ultra quatuor aut sex hebdomadas enematribus protrahi nequit ; rectum enim et intestina crassa, cibum nutrientem, per enemata datum, in chylum mutare recusant.

Immò corpus humanum in fluidum aliquod nutriens immersione nutriri posse fertur, mor-  
bique

---

\* Vid. MAUCHART, in Dissert. de Struma Oesoph.  
pag. 25.

Etiam, MORGAGNI de Sed. et Caus. Morb.  
Epist. xxvii.

Etiam, TRILLERI, Dissert. de Ufu Enemat.  
nutrient.

bique nonnulli, v. g. febres intermittentes, remediis extrinsecùs applicatis sanantur \*.

Dr CHALMERS manum in aquam tepidam immerfam  $\frac{3}{4}$ ss. aquæ, horæ quadrantis spatio absorbuiffe memorat †; hinc, si manus superficies sit ad totam corporis superficiem sicut 1 :: 60, totum corpus eodem tempore duas ferè libras aquæ absorbuiffet. Idem piscatoribus benè notum, per aquam enim vadentes nunquam sitiunt; nec equus itinere (ut benè norunt viatores) dum pluit bibere cupit; idemque certissimè ex ranis probatur, ut docent experimenta Domini TOWNSON.

Spasmo

---

\* Vid. Experiment of Dr PÿE, Med. Obs. and Inq. vol. ii.

† Vid. LOND. Med. Transf. vol. ii. pag. 102. edit. 1772.

Spasmo verò diu manente, cibum et remedia in ventriculum per virgam cetaceam detrudenda, auctores suadent. Hoc fecerunt WILLIS et HBYSHAM \*. Metuendum autem est ne lædatur œsophagus ; instrumentum igitur describam, huic rei accommodatius, a Patre meo, ante triginta abhinc annos, excogitatum.

Hoc instrumentum utre magno, e gummi elastico fabricato, constat ; cui 'tubus longus flexilis inferitur, cujus in ore epistomium intercludens ponitur. Tubi hujus diameter quadrantem pollicis, ejus longitudo novemdecim aut viginti pollices, æquat.

Hic tubus, quo faciliùs flectatur, e lamina argentea, in formam spiralem contorta, fabricatur, corioque molliſſimo tegitur.

Quo

---

\* Vid. EDIN. Med. Com. vol. vii.

Quo a tubi flexura nimia dum detruditur, præcaveatur, ejus partem quoque constituit filum æneum crassum per eum transiens, superne reflexum, ne in ventriculum decidat, ac mucrone conico munitum, ne tubus œsophagum lædat.

Priusquam adhibeatur instrumentum, oleo vel axungiâ porcinâ illinatur oportet.

Hoc instrumentum in Tab. XIV. delineatur.

In Actis Chirurgicis, LONDINI editis anno 1793, J. HUNTER instrumentum quodammodo simile, his verbis descripsit :

“ The instrument made use of, was a fresh  
 “ eel skin, of rather a small size, drawn over  
 “ a probang, and tied up at the end where it  
 “ covered the sponge, and tied again close to  
 “ the sponge, where it is fastened to the  
 “ whalebone ; and a small longitudinal slit  
 “ was made into it, just above this upper li-  
 “ gature.

“ To



“ To the other end of the eel skin was fix-  
“ ed a bladder and wooden pipe, similar to  
“ what is used in giving a clyster, only the  
“ pipe large enough to let the end of the  
“ probang pass into the bladder without fill-  
“ ing up the passage. The probang, thus co-  
“ vered, was introduced into the stomach,  
“ and the food and medicines were put into  
“ the bladder, and squeezed down through  
“ the eel skin. An eel skin seems very well  
“ adapted for this purpose, being smooth,  
“ pliable, and readily passed into the stomach;  
“ but as cases of this kind may occur where  
“ eels cannot be procured, a portion of the  
“ gut of any small animal, as a cat or lamb,  
“ will make a very good substitute.”

J. HUNTER postea dicit, “ that this instru-  
“ ment did not produce irritation ;” nec ex  
instrumento a Patre meo proposito irritatio  
facta est. Hoc verò omnibus in exemplis  
minimè

minimè verum est, in exemplo enim ab AIRD tradito \*, res aliter se habuit.

Animadvertendum est quoque, re aliquâ in guttur fortiter impulsâ, vomitum non æquè facilitè ac eadem partes tantùm leviter titillante, excitari.

Horum instrumentorum alterutrum feliciter adhiberi potest, aut œsophago spasmo aut paralyfi laborante, aut veneno in ventriculum cepto.

Instrumentum verò priùs descriptum, huic ufui, altero melius inservire videtur; illo enim remedia, leniendi veneni symptomata causâ, in ventriculum injecta, per utris resiliencia latera extrahi possunt, minimè verò per hoc a J. HUNTER propositum.

Instrumentum tale quoque utilissimum est materie acri in ventriculum admisâ, aut aëris  
enormi

---

\* Vid. EDIN. Med. Essays, vol. i.

enormi copiâ ex fermentatione ibi nata, ficut in animalibus ruminantibus, frugesque succulentas devorantibus, contingit.

Aëre enim irritatur ventriculus, constringitur œsophagus, et, persistente fermentatione, ventriculus ita tandem distenditur, ut mors sequatur.

Aër autem ibi inclusus, per tubum flexilem in ventriculum detrufum, certiffimè emitti potest.

Pater meus, in scriptis res novas continentibus, (Anglicè *newspapers*), rationem edidit, qua aër e ventriculis animalium ruminantium distento, removeatur. Verba ejus hîc loci referam.

“ The fwelling of the belly is owing to the  
“ distention of the stomach, and particularly  
“ the first stomach, by fixed air or carbonic  
“ acid gas, which is disengaged from the ten-  
“ der and succulent grafs, in consequence of  
“ its quick solution and violent fermentation,

L

“ while

“ while the discharge of it upwards, through  
“ the gullet, seems to be prevented by a spasm  
“ or muscular contraction of the upper ori-  
“ fice of the stomach. The dangerous and  
“ often fatal effects which follow the disten-  
“ tion, are not owing to the fixed air, or the  
“ juices of the fermented grass, acting as poi-  
“ sons upon the stomach, as a moderate quan-  
“ tity of either produces no bad effects ; be-  
“ sides, the repeated experience of the gra-  
“ zier has shewn, that many cattle are imme-  
“ diately relieved and preserved, by stabbing  
“ them with a knife or trocar, or by forcing  
“ a rope down their throats, and thus allow-  
“ ing the air to escape.

“ Cattle, therefore, may with certainty be  
“ saved, if the air be drawn off in due time,  
“ without injuring the stomach or bowels ;  
“ and this may easily be done, by passing a  
“ flexible tube, from the mouth, down the  
“ gullet, and into the stomach.

“ This

“ This tube is to be composed of an iron  
“ wire, much larger than a common stocking-  
“ wire, or about  $\frac{1}{10}$ th part of an inch in dia-  
“ meter. In order to give it the cylindrical  
“ form, it is to be twisted around a thick rod  
“ of iron ; and, after taking it off the rod a-  
“ round which it was turned, it is to be co-  
“ vered with smooth leather.

“ To the end of the tube, which is intend-  
“ ed to be passed into the stomach, a brazen  
“ pipe, two inches long, of the same size as  
“ the tube, and pierced with a number of  
“ holes, is to be firmly connected.

“ To prevent the tube from bending too  
“ much within the mouth or gullet, in time  
“ of passing it down into the stomach, an  
“ iron wire,  $\frac{1}{8}$ th of an inch in diameter, and  
“ of the same length as the tube, is put with-  
“ in it, which is to be withdrawn when the  
“ tube has entered the stomach.

“ The

“ The space from the foreteeth to the bot-  
“ tom of the first stomach of the largest ox,  
“ measures about six feet; the tube, there-  
“ fore, ought to be six feet long, that we may  
“ be sure of its answering the largest oxen.

“ And, to prevent the tube from being in-  
“ jured while it is introducing, a speculum  
“ oris, of a large size, the under plate of  
“ which is one foot long, and three inches  
“ broad, and the screw which separates the  
“ two plates about six inches in length,  
“ should be previously put into the ox’s  
“ mouth, that his tongue may not come in  
“ the way, and that he may not crush or  
“ break the tube with his teeth.

“ After the tube is passed into the stomach,  
“ it may be allowed to remain within it for  
“ any given length of time, as, when it is  
“ pressed to one side of the throat, it does not  
“ interrupt the breathing of the animal.

“ The

“ The greater part of the elastic and con-  
“ pressed fixed air will pass through the tube,  
“ and, if it be thought necessary, the remain-  
“ der of it, or the superfluous drink, may be  
“ sucked out by bellows fixed at the upper  
“ end of the tube, with a couple of valves,  
“ one at its muzzle, and the other in the side  
“ of it, so disposed as to allow the air to pass  
“ in the direction outwards.

“ And it is material to add, that Mr WAL-  
“ KER \* has saved the lives of many sheep,  
“ as well as black cattle, by using this instru-  
“ ment; and, from a late publication†, it ap-  
“ pears, that this is a matter of much mo-  
“ ment, and well worth the attention of the  
“ farmer, as a great proportion of sheep, not  
“ less

---

\* WALKER on the Diseases of Cattle.

† NAISMYTH on Sheep.



“ less than  $\frac{1}{5}$ th of the whole flock, sometimes  
“ perish from this cause.

“ It is also evident, that ardent spirits, or  
“ any other fluid fit for checking fermenta-  
“ tion, or other substances which may be use-  
“ ful in other respects, can be injected through  
“ such a tube ; also, the air is not only more  
“ certainly discharged than by stabbing the  
“ animal, but the danger is avoided which  
“ the stabbing occasions, not so much by the  
“ irritation which the wound creates, as by  
“ the air, and other contents of the stomach,  
“ getting into the cavity of the belly, be-  
“ tween the containing parts and the bowels,  
“ exciting such a degree of inflammation as  
“ frequently proves fatal to the animal.”

In dyspepsia, hysteria, typho, ventriculi hu-  
mani inflationem spasmo cardiæ comitatam,  
Pater meus aliique aliquoties notaverunt.

---

---

CAPUT SEXTUM.

## DE OESOPHAGI PARALYSI.

Hæc œsophagi conditio morboſa haud rarò occurrit, et nunc partem tantùm morbi totius corporis, nunc morbum œsophago proprium, conſtituit.

Hemiplegiâ aliisque paralyſeos exemplis, œsophagus aliquando laborat. Æger Patris mei curæ mandabatur, qui dimidiam faltem ſolidi cibi partem quem devorare conatus eſt, evomebat: Cibus, ut videtur, œsophago ejus inhærens, eundem effectum ac pluma gutturi ſani admota edidit.

Hic morbus, nunc per breve temporis ſpatium, nunc per totum vitæ decurſum, ægrum vexat.

WILLIS

WILLIS exemplum paralyseos fibrarum œsophagi musculofarum tradit, in quo æger, cibo suo stylo balænario in ventriculum detruso, in octodecim annos vitam protraxit\*.

Opusculi hujusce fines, de plurimis aliis exemplis a scriptoribus traditis, nos plenius differere vetant. De his consuli possunt scriptores infrà notati †.

DE

\* Vid. Pharm. Ration. P. I. sect. i. cap. 2.

† Vid. ZELLER. in Bald. n. Magaz. viii. B. p. 175.

Ephem. Nat. Cur. Decur. II. Annò III.  
Obs. 48.

MORGAGNI Epist. xxviii. art. 4.

SCHENK. Obs. Med. L. iii. Obs. 13.

SCHURIG. Chylologia, pag. 267.

TULPII Obs. Med. L. i. c. 42.

LANGII Opp. II. pag. 10, 11.

HOFFMAN. (FRED.) Med. Consult. tom. i.  
pag. 232.

AETII Tetrab. II. Serm. ii. cap. 33.

MARCELLI DONATI L. iii. c. 8. p. 261.

## DE PROGNOSI.

Pharyngis aut œsophagi paralyfis, cæteris etiam corporis organis integris, periculo summo nunquam vacat.

Quoniam ex hoc morbo paucos sæpè post dies supervenit mors, nihil dubito quin periculum morbi non solum ex difficultate aut impotentia cibos devorandi proveniat, sed etiam iis nervis malè affectis, quorum rami œsophago dantur.

Oesophago igitur paralytico manente, nec cor, pulmones, aut viscera chylopoëtica, in quibus cæteri rami paris vagi nervorum finem habent, eodem modo lædantur, timendum est.

DE CAUSIS OESOPHAGI PARALYSIM  
EXCITANTIBUS.

Rationem certam paralyseos reddere nequimus.

Medici de causis morborum reddendis solliciti, varias hujus morbi rationes tradiderunt; modum autem quo paralyfim producunt, penitus explicare non suscipiam.

In exemplis paralyticis pluribus, salivam, mukumque gutturis, non copiâ usitatâ fecerni observatum est: hinc, omnes res salivam mukumve removentes aut abradentes, quales sunt liquores calidi, ad dysphagiam cendam aliquid conferre possunt: hinc, alii rationem reddiderunt cur fœminæ huic vitio magis opportunæ quàm viri sunt; theæ scilicet infusum calidum majori copiâ forbere solent\*.

Fœminæ autem plus quàm viri mobiles naturâ esse videntur; indè dysphagiæ magis obnoxia sunt.

DE

---

\* Vid. COWARD. De fermenti vitali Nutritio. LONDINI, 1695.

DE PARALYSEOS OESOPHAGI  
DIAGNOSI.

Oesophagi paralyfis partem tantum morbi totius corporis aliquando constituit.

Faucibus, propter devorandi difficultatem, aridis, dignoscitur. Ægram nuper vidi, quæ inter fluida etiam forbendum, guttur sibi interclusum, tussimque vehementissimam excitatam, sensit.

Vox quoque deficit aut amittitur.

Intestinis affectis, sequitur constipatio.

## DE MEDENDI RATIONE.

Præter remedia in aliarum partium paralyfi, vulgò intus aut extrà adhibita; in oesophagi paralyfi curanda, remedia quoque stimulantia, tubis vel virga balænaria, parti oesophagi interiori felicissimè applicari possunt.

Tubo

Tube uno metallico in guttur detruso, altero ad cordis scrobiculum applicato, scintilla electrica secundum œsophagum mitti potest.

Oesophagi paralyfi diu perstante, æger vel enematibus vel cibo per œsophagum virgulâ balœnariâ detruso, (sicut fecit WILLIS), diu nutriri nequit: Si verò instrumentum hoc adhibeatur, ne fibræ œsophagi musculosæ nimium distendantur, adeoque morbus ingrauescat, periculum est; immò ægrorum exemplo qui hoc modo perierunt, memorantur.

Vel tubi flexilis, prius in pag. 77. memorati, utrisque elastici ope, jus carnesque in ventriculum injici possunt.

---

## [CAPUT SEPTIMUM.

Dysphagia aliquando etiam oritur, vel ex rebus fedantibus in ventriculum receptis, quibus  
bus



bus œsophagus muneri suo impar fit, vel ex rebus stimulantibus devoratis, aut fermentatione genitis, ventriculum vel distentione, vel irritatione lædentibus.

Ad opium ab eis qui mortem sibi met ipsis consciscere volunt, sæpè refugitur; undè medici solertia necessaria est, ut ab effectibus ejus funestis præcaveatur.

Quò ex opio symptomata nascentia faciliùs leventur vel tollantur, breviter auctorum sententias de modo, quo corpus humanum ab eo læditur, attingam.

Alias reverà benè multas hujus rei rationes reddere, alii conati sunt medici.

Hanc verò rem penitùs expendere, neque experimentorum aut conclusionum, indè ductarum fidem perscrutari, in animo est.

Opium verò in animalia per nervos solos partis cui admovetur agere, credit WHYTE. Fontana contra, ea per sanguinem affici affirmat.

Pater

Pater meus opium, aliaque venena, non solum nervos afficere, sed id quoque absorberi, et tunc opium sanguini permixtum, in cordis et vasorum nervos totumque genus nervosum agendo, animalia extinguere, multis experimentis, collegit.

Dr ALEXANDER venenum resorberi negat.

Medicus aut chirurgus citò post opium, aut opii tincturam, devorata, in auxilium arcessitus, funestos effectus sæpè arcere potuerit.

Pater meus hominem vidit, qui ex permagna opii dosi stupore afficiebatur; superstite tamen sorbendi facultate, (res boni ominis), quique post portiones emeticorum zinci vitriolati et antimonii tartarifati, quæ vomitum citò motum in duas horas protraxerunt, convaleuit.

Dominus MACAULAY exemplum juvenis a se visi, qui 3ii opii devoraverat, mecum communicavit, quique remediis similibus usus convaleuit.

Vir

Vir robustus, paroxysmis hyſteriæ ſimilibus obnoxius, paroxyſmo finito, vini Gallici cyathum ſumere ſolebat; ſed, errans, cyathum laudani liquidi plenum exhaustit.

Paulò poſt, errore cognito, vomitum fruftrâ ipecacuanhâ et antimonio tartariſato movere conatus eſt.

Æger, horâ undecimâ A. M. opii tincturam forpſerat; eumque poſt tres horas elapſas viſebam: tum comate laboravit, pulſusque arteriarum circiter quinquagies minuto horæ primò micabant, et clarè ſtertebat.

Poſtquam ita parumper permanſerat, vehementiſſimè exclamavit; et dein convulſionibus correptus fuit, ſpumâ ex ore fluente.

Vomitum, ob œſophagi ventriculique ſenſum abolitos, moveri nequivit.

Quò laudani effectus leniores eſſent, ei in ventriculum, inſtrumento in Tab. XIV. depic-  
to, permagnam aquæ tepidæ quantitatem  
injeci,

injeci, faucibus simul per oris speculum ductis.

Paulò post enema stimulans per anum injectum fuit ; et vesicatorio ventriculo, et cataplasmatibus sinapi utrique pedi impositis, abii.

Horâ P. M. octavâ, eum mortuum reperi.

*Oxidum* arsenici album vulgò tanquam venenum devoratur ; et, nisi sulphure junctum, corpus humanum violenter afficit.

Discrepant auctores de modo, quo in corpus humanum agit.

Ex WEPFERI \* SPROEGELIIque experimentis, *oxidum* arsenici album cuti admotum inflammationem inducere, indéque tunicam ventriculi internam arsenico devorato inflammari, colligitur.

In

---

\* De Cicut. Aquat. Ed. BASIL, anno 1716.

In museo mei Patris servatur hominis ventriculus, cujus superficies interior gangrænâ ob arsenicum devoratum exesa est.

Alii *oxidum* arsenici album per spiculas, alii in genus nervosum agendo, necare credunt.

*Oxidum* arsenici album œsophago et ventriculo ardorem et dolorem immanem movet; his superveniunt nausea et vomitus perpetuus; cardia tamen nonnunquam spasmis adeò astringitur, ut vomitus fieri nequeat; in hujusmodi exemplis, ventriculus tantoperè aëre distenditur, ut si pungatur aër magno cum strepitu erumpit.

Ab hoc igitur ne ventriculus rumpatur cavendum.

Spiritus simul difficile et cum dolore trahitur.

Arsenici *oxidum* album etiam nervorum distentiones inducit; sique æger diris ejus ef-

N

fectibus

fectibus supervixerit, paralyfis omni medicinæ sæpè resistens, supervenit.

Dolor et intestinorum ardor maximè augmentur ; et tandem corporis tumor et maculæ, et pulsus arteriarum celerrimi et abnormes, convulsiones, sudores gelidi, et delirium quibus æger succumbit, superveniunt.

Qui fusiùs de signis arsenico illatis certior fieri velit, auctores infrà notatos evolvat \*.

Alia remedia, digitalem, nimirùm, hyoscyamum, cicutam, aconitum, &c. nimiâ copiâ  
data

---

\* LIEUTAUD Hist. Anat. Med. vol. i. pag. 39.

MORGAGNI Epist. iii. et vi.

WEFFERI Cicut. Aquat. Hist.

PLENK. de Venenis.

MEAD on Poisons, pag. 220 et 221. 8vo edit.



data, signa his quæ arsenicum movere solet haud dissimilia ciere, hîc loci memoratu dignum videtur.

Quasdam tamen res quibusdam animalibus lethales, aliis animantibus minimè nocere, notandum est; sic, capri cicuta, vaccis perniciosissima, impunè vescuntur\*; porci hyoscyamo pinguescunt; equus vitri antimonii quantitatem quæ centum homines necaret, impunè tolerare potest; canis opii copiam homini huic non assueto lethalem, sine periculo devorare potest: Contrà autem, dosis jalapæ aut nucis vomicæ, aut amygdalæ paucæ amaræ, eundem convellerent aut extinguerent.

Si medicus in foro sententiam suam num mors alicui arsenico illata fuerit, interrogetur, ad hæc indicia præcipuè animum attendat.

Arsenicum

---

\* Vid. WITHERING'S Arrangement of British Plants, vol. ii. p. 304.



Arfenicum ob pondus et difficultatem quâ solvitur, alias inter res in ventriculo reconditas, detegi potest, plurimâ aquâ eis affusâ, ut res supernatantes abluantur; dum hoc fit, arfenicum pondere suo inum vas petit, et accuratè collectum, exsiccatum, et experimentis subjectum, ita detegitur.

*Oxidum* arsenici album ferro eadenti injectum, vaporem album emittit, et si carbonicum adfit odorem allii diffundit.

Hoc *oxidum* in formam metallicam reducitur, si eum pulvere ex duabus partibus tartari cum una nitri ad carbonem deflagratis teratur, et tubo vitreo leviter obturando indatur, et justò caloris gradui objiciatur.

Arfenicum hoc modo reductum, inter duas cupri laminas positum, et carbonis pulvere circumdatum ad aërem arcendum, ignis ope in vaporem vertitur, qui euprum colore plumbeo argenteove tingit,

Si

Si arsenicum ferro ad tantum caloris gradum calefacto injiciatur, ut arsenicum in vapores abeat, odor allii diffunditur; si autem ferrum adeò calefiat, ut arsenicum ignem concipiat, odor allii multò minor quàm in priori exemplo percipitur.

## DE MEDENDI RATIONE.

Veneni expulsio e corpore, medico primùm aggredienda.

Ipsa venena vomitum sæpissimè per se ciunt; præterea, inter vomendum, remedia ventriculum a venenis defendentia, et eadem diluentia, adhiberi debent.

Emetica autem interdum dentur oportet.

Cardia tamen spasmò constricto, nihil nisi vi impulsus ventriculum intrat; ideoque WEPFERUS tubum flexilem in ventriculum detrufit; instrumento verò suprà, pag. 77, descripto, venenum dilui ac deinde elici potest, siquidem evomi nequit.

Si

Si venena extrahi nequeant, auxilia quæ eorundem acrimoniam minuunt, necessaria fiunt: Ad hanc rem, NAVIER, solutionem hepatis sulphuris, quam arsenicum innoxium miteque reddere credit, laudat.

Ut ab arsenici actione defendantur ventriculus et intestina, utque leniter simul solvatur alvus, oleum ricini, jusque ovinum, dari potest.

Lac, olea, et præsertim ovorum alba, quippe arsenicum suspensum tenent, profunt.

Cathartica fortiora, stimulo suo, intestinorum dolorem inflammationemque augent.

Si æger aliquandiu supervixerit, diæta mitissima convalescenti præcipienda est. Dato subindè opii pauxillo, scintilla electrica adhibeatur, quo ingens mobilitas quæ arsenico efficitur, ut nos docet cel. DE HAEN, minuatur.

Quoniam ab eis qui vitam sibi venenis extinguere volunt, ad arsenicum opiumve vulgò confugitur,

confugitur, de indiciis indè illatis, remediisque quibus his occurratur, suprà copiosè dictum est.

De venenis autem aliis differere, opusculi hujus limites minimè finunt.

Quantum diversa ciborum genera, quæ in fermentationem ruunt, in ventriculum vi ferdante agunt, experientia nos nondum docuit: quoties autem aër tantâ vi intra ventriculum colligitur, ut spasmus moveat, e ventriculo, modo suprà, ad Caput Quintum, descripto, elici debet.

---

## CAPUT OCTAVUM.

### DE DYSPHAGIA, RUPTURA, VULNERIBUSQUE, OESOPHAGI NATA.

Oesophagus, vomitûs vi, nonnunquam divellitur.

Dr

Dr DRYDEN Patri meo exemplum narravit, in quo, vomitûs vi Gula disrupta, Pleuraque sinistra divulgata fuit \*, adeò ut in hujus cavum ea quæ in ventriculo continebantur, transiissent, et brevi mors.

Oesophagus etiam aliquando vulneratur.

Hoc in exemplo, sufficit ut partes divulgatæ sibi accuratè per *suturam interruptam* admoveatur. Quàm citissimè conficiendum est hoc opus, aciculis, ne vasa sanguifera nervique lædantur, intrinsecùs ingredientibus factam. Totumque vulnus pannis densioribus tegendum; aër enim frigidus, eas ad partes, ac præcipuè nervos principes, qui propè oesophagum cursum tenent, admissus, maximum periculum inferre solet.

---

\* Vid. etiam BOERH. Opuscul. pag. 98.

---



---

TABULARUM EXPLICATIO.

---

T A B. I.

Fig. 1.—Hæc figura cursum fibrarum musculofarum ex parte œsophagi anteriori indicat.

AA Fibræ œsophagi externæ musculosæ in longum abeuntes.

BB Fibræ interiores musculosæ transversæ.

CC Membrana pharyngis intima.

Fig. 2.—In hac figura fibræ externæ longitudinales, supra partem œsophagi inferiorem et cardiam, delineantur.

Fig. 3.—Hac in figura fibræ musculosæ ex pharyngis œsophagique parte posteriore depinguntur.

AA Fibræ obliquæ musculosæ pharyngis externæ.

B Fibræ pharyngis longitudinales musculo-  
fæ.

aa Membrana pharyngis intima.

CC Fibræ longitudinales œsophagi externæ  
musculofæ.

DD Fibræ musculofæ œsophagi interiores  
transversæ.

Fig. 4.—Hæc figura ostendit cursum fibra-  
rum œsophagi musculofarum interiorum, supra  
partem œsophagi inferiorem et cardiam.

Fig. 5.—

AA Fibræ musculofæ externæ longitudinales  
œsophagi.

BBBB Membrana œsophagi intima, quæ in  
tres partes dividi potest.

Plicæ ex hujus membranæ duplicatura for-  
mantur, suntque evidentissimæ, quæ duæ aci-  
culæ inferuntur; nam œsophagus figuræ parte  
superiori expanditur, et hinc plicæ visum pe-  
nitùs effugiunt.

Lineæ



Lineæ ad partem figuræ superiorem undas referentes, vascula sanguinea monstrant.

Fig. 6.—Partem qua œsophagus ventriculum ingreditur, ostendit.

A Speciem ferè radiorum instar, quam plicæ membranæ internæ ad cardiam exhibent, monstrat.

BBBB Tunica ventriculi villosa.

---

T A B. II.

Hæc tabula fibras musculosas œsophagi bovis monstrat.

AA Fibræ musculosæ externæ sese invicem decussantes ad partem figuræ mediam.

BB Fibræ musculosæ interiores sese invicem decussantes, more linearum literæ X.

---

T A B. III.

Fig. 1.—Oesophagum pueri novennis monstrat, in quo nummus æneus, quatuor annorum

rum spatio, inhæserat: undè factum fuit, ut œsophagus ad locum literâ C designatum ampliatus, et ad partem B notatam præter naturam constrictus et induratus fuerit.

Porro infra partem dilatatam, œsophagus justò angustior est.

Fig. 2.—refert tumorem cavum, partim intra, partim extra nares, situm.

AA Pars tumoris quæ situm habuit intra nares.

BB Pars tumoris quæ extra nares situm habuit.

D Fistulam per quam filum ex viscere felino E immissum fuit; F stylum bifidum, quo filum ad partem tumoris superiorem, trusum fuit.

Hoc modo tumor sublatus fuit.

Fig. 3.—partem superiorem tumoris monstrat,

T A B.

---

T A B. IV.

In hac et sequenti tabula, fines solùm instrumentorum infimi, justâ magnitudine, depinguntur.

Cæteræ partes instrumentorum justæ tantum longitudinis partem tertiam exæquant.

Fig. 1. et 2.—hamos obtusos, ad pecuniam ex gutture extrahendam, monstrant.

Figuris ambabus partes notatæ AA e chalybe fabricantur; cæteræ instrumentorum partes ex stylo balænario constant.

Fig. 3.—instrumentum ad acus ex gula removendas monstrat.

A Os cetaceum, cui fetæ BBBB inferuntur.

CC Fistula e corio mollissimo confecta.

Quando instrumentum infra partem cui inhaeret acicula, detruditur, fistula primò est subducenda, et tunc os cetaceum, cui fetæ inferuntur: quo fiat ut acus irretiantur.

In

In Fig. 4.—instrumentum aliud ad aciculas ex gula removendas delineatur.

Constat ex osse cetaceo, cui forceps AA, e chalybe fabricatus, affigitur, qui clauditur annulis metallicis BB, vique suâ refiliendi deducitur forceps.

Hoc instrumentum per œsophagum immititur; et quando est, cur putemus corpus extraneum inter forcipis dentes sedere, rem forcipe arreptam subducimus.

Fig. 5.—constat ex stylo balœnario cui duo globuli ex ebore tornati affiguntur.

EXPLICATION

## T A B.      V.

Fig. 1. — instrumentum ab Domino JARDINE propositum, ut res parvæ in œsophago reconditæ tollantur, monstrat.

Instrumentum ex filo æneo AA, fistulâ coriaceâ B tecto, constat.

Partes

Partes visceris felinei juxta finem fistulæ B inferuntur, et ad partem inferiorem fili ænei C.

Fistulâ detrusâ, partes visceris felinei extrorsum moventur, et quo plus fistula deprimitur, eo plus partes visceris felinei ab filo æneo removentur.

Instrumentum in œsophagum detruditur, uti in Fig. 1. delineatur; detruso autem in œsophagum infra corpus extraneum, fistula deprimitur, uti in Fig. 2. delineatur; et ita fortassè corpus extraneum deprehendemus.

Sed cum fistula coriacea viginti pollices longitudine exæquans, justâ exilitate, et pretio fati vili fabricari nequeat, instrumentum simile ex filo æneo, vel virga balænaria, fieri potest. Vide Fig. 3.

AA Virga balænaria, cui partes visceris felinei, uti in exemplo priori, figuntur.

BBB Annuli.

Annulos

Annulos deprimendo partes visceris felinei,  
longiùs ex filo æneo removentur.



## T A B.      VI.

Hæc tabula capitis sectionem exhibet, ut  
tumoris situs ex superiore gutturis parte nas-  
centis, et modus quo deleri potest, faciliùs in-  
telligatur.

Fig. 1.—tumoris ex gutture nati, æquè fir-  
mi ac uterus non gravidus, sectionem exhibet :  
multis vasculis scatebat.

Fig. 2.—

- AA Capitis sectionem exhibet.
- BB Partem externam naris dextri.
- C Septum inter nares et os.
- D Uvulam.
- E Vertebrae cervicis.
- F Tumorem, Polypum dictum.
- G Tubum per narem immissum.

Tubus

Tubus in narem immittitur, cum viscere felineo, quod dein inter uvulam D et tumorem F deprimendum est. Digito in os immisso, vel instrumento Fig. 4. depicto, viscus felineum sursum truditur, et tumoris radicem amplectitur. Viscere felineo arcto reddito, tumor brevi deletur.

---

T A B. VII.

Hæc tabula duos tumores ex œsophago natos exhibet; œsophagus prætereà est morbosus.

A Epiglottidem.

B Partem pharyngis posteriorem.

C Oesophagum.

DD Oesophagi partem indurata[m] et angustatam.

E et F Tumores ex œsophagi membrana intima nati.

I et K Oesophagi tunicam intimam morbosam, parte tunicæ intimæ œsophagi pure exesâ.

M Aortam descendentem.

P

T A B.



---

---

T A B. VIII.

Æger ex quo hoc specimen adeptum fuit,  
diu dyspnœa dysphagiaque laborabat.

Hâc tabulâ, conspectus posterior aneurisma-  
tis ingentis aortæ arcus, initiique aortæ def-  
cendentis, circiter molis naturalis partem di-  
midiam, exhibetur.

- A Ingressum venæ cavæ inferioris in cor-  
dis auriculam dextram.
- B Auriculam dextram.
- C Ventriculum dextrum.
- D Auriculam finistram.
- E Ventriculum finistrum.
- FHI Aneurisma aortæ arcus.
- G Arteriam subclavianam finistram.
- L Oesophagum ex trachea aneurismate  
divulsum.
- M Partem œsophagi inferiorem sursum  
versam.
- N Tracheam.

- O Locum quo in duos ramos trachea dividitur.
- P Ramum dextrum.
- Q Ramum finiftrum, compreffum et anguftatum aneurifmatis mole.

---

T A B. IX.

Hæc tabula naturæ lufum vaforum ex aortæ arcu orientium exhibet : quo devoratio et respiratio impediri potuiffent.

Hoc in exemplo rami quatuor ex aortæ arcu originem duxerunt.

- A Aortæ arcum.
- B Carotidem dextram.
- C Carotidem finiftram.
- D Arteriam fubclavianam dextram. Originem ducit ex aortæ arcu paulò infrà tres alias arterias, indè dextrum latus petit, iterque tenet ponè tres alias arterias, et ponè tracheam F.

E

E Arteriam subclavianam sinistram.

GG Arterias vertebrales.

HH Sterni extremitates incisas.

K Laryngem.

F Tracheam.

T A B. X.

Ægra ex qua hoc specimen exsectum fuit  
dysphagia diu laboraverat.

Hac in tabula ulceris dextri lateris pharyngis  
fitus exhibetur. Situs ulceris verus conspectu  
partium laterali in Fig. 1. conspicitur, et locus  
ulceris ab literis A, B, C, D, notatur.

Per ulcus hoc, pharynge exesâ per forami-  
na EEE pus in laryngem erupit, ægramque  
suffocavit.

F Oesophagum apertum monstrat.

Fig. 2. — conspectum earundem partium  
posteriores monstrat.

A Epiglottidem.

B Laryngis corpus morbosum et indura-  
tum.

C Oesophagum apertum.

DDD Foramina pure exesa, ita ut materies purulenta sub epiglottide, inque laryngem tranierit.

---

## T A B. XI.

Hæc tabula partes œsophagi posteriores, easque quæ ei vicinæ sunt, exhibet.

Hoc in exemplo, materies purulenta in œsophago nata, iter inter œsophagum et tracheam fecit, et in tracheam irrupit, quo æger suffocatus fuit.

AA Oesophagum.

B Partem œsophagi ulcere exesam ostendit.

C Tracheam.

D Acum transmissum per iter præter naturam factum inter œsophagum et linteram E ramum dextrum tracheæ.

F Partem œsophagi coangustatam.

G Plicas tunicæ intimæ œsophagi.

H Aortæ arcum.

- I Ramum ex aortæ arcu ortum arteriæ  
carotidi et subclavianæ dextri lateris  
communem.

---

T A B XII.

Hæc tabula tumorem monstrat ad tertiam  
prioris molis partem minutam, atque modum  
quo radicitus tolli potuisset.

Qui plura vult de hoc exemplo miro, is  
consultat, ED. PHYF. ESSAYS, vol. iii.

- A Narem.  
B Partem genæ.  
C Linguam.  
D Uvulam.  
E Amygdalam dextram.  
F Epiglottidem.  
G Glottidem.  
HH Partem pharyngis posteriorem.  
I Partem œsophagi inferiorem.  
KKK Partes tumoris diversas.  
L Viscus felineum.

Viscus

Viscus felineum duplex cum tubo N per narem in os immitti debet, et tumor irritato gutture in os evocatur; hoc facto, si rursus visceris felinei fila a se invicem separentur, tumor inter eos recipi potest, et inclusus, in œsophagum simul cum viscere felineo redibit, tunc per fistulam flexilem N viscus felineum adeo arctè radicem tumoris constringit, ut circuitum sanguinis per eum impediat, et ita tumor decidet.

M Tumoris radix.

OO Duo annuli fistulæ affixi, circa quos viscus felineum figi potest.



T A B. XIII.

Fig. 1. et 2.—Tumores ex gutture sublatos ostendit.

Fig. 3.—Tumoris sectionem in gula nati ostendit.

Fig. 4.—Tumoris sectionem qui ex amygdala pendebat, indicat.

Fig.

Fig. 5.—instrumentum exhibet quo nitræ argenti tumoris ligatura sublatis radicibus ad-moveri potest ; consilio præcavendi ne tumor renascatur, partimque sanguinis fluxum sisten-tendi causa.

Fig. 6. — ejusdem instrumenti sectionem ostendit.

A Argenti nitratis receptaculum.

BB Filum argenti, nitratis receptaculo af-fixum.

C Aciculam quæ utrisque ex foraminibus  
FFF in instrumenti caule perterebratis,  
qua nitratis receptaculum plus minus-  
ve pro chirurgi arbitrio ex fistula  
DDD protruditur.

---

#### T A B.      XIV.

Hæc tabula exhibet instrumenta juxta mag-nitudine, tertiam tantum juxtæ magnitudinis partem exæquantia ; si excipias quartam figu-ram, quæ operationibus in corpore humano instituendis juxtam habet magnitudinem.

Fig.



Fig. 1.—ampullam ex gummi elastico fabricatam refert.

B Epistomium, quo cavetur ne liquor ex ampulla effluat.

C Epistomii finis, qui inferitur fini infimo tubi DD, in Fig. 2. exhibiti.

Finis superior tubi DD rotundus fieri debet, ne œsophago, inter immittendum, noceat.

Fig. 3.—filum æneum exhibet, quod inferitur tubo DD, ne hic dum in œsophagum transit, nimium flectatur. Finis A debet esse conoideus, ut finem superiorem DD quam accuratissimè impleat.

Fig. 4.—speculum oris GARENGEOT exhibet. Ex duabus laminis metallicis A B, quæ sibi invicem columnis C D annectuntur, constat. Hæ duæ laminæ cochleam E (Anglicè *screw*) movendo, a se longiùs distabunt: et


Q

hinc

hinc os plus minùs, pro chirurgi arbitrio, aperiri potest. Hoc instrumentum jùsta mole fabricatum, adhiberi potest, quando tubo in pagina 83. descripto utimur, ad aërem in ventriculis quadrupedum natum eliciendum, ne tubus ab animalium dentibus lædatur.

FINIS.

TAB. II.




1. *Syfe del:*

*He. Archibald Sc.*



TAB. III.







TAB. IV.

Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 2.



Fig. 1.




Fig. 3.









Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 3.





Fig. 4.
















TAB. IX.



A. Fyfe del<sup>t</sup>

D. Lizaes Sculp<sup>t</sup>








Fig. 1.




















Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.

